

ଓଡ଼ିଶାରେ ରାଇ ସୋରିଷ ଓ ସୋରିଷ ଫସଲରୁ ଅଧିକ ଅମଳ ପାଇବା ପାଇଁ ଧାଡ଼ିବୁଣା

ଚୈଳବାଳ ଫସଲ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତ ବିଶ୍ୱରେ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରିଛି । ଭାରତରେ ଲୁଣ କରାଯାଉଥିବା ସାତୋଟି ଚୈଳବାଳ ଫସଲ ମଧ୍ୟରେ ରାଇ ସୋରିଷ (Mustard) ଓ ସୋରିଷ (Toria) ରୁ ଗତକଥା ୨୮.୬ ଭାଗ ଉତ୍ପାଦନ ମିଳିଥାଏ । ମୋଟ ଚୈଳବାଳ ଉତ୍ପାଦନର ଗତକଥା ୨୭.୮ ଭାଗ ଦିନାବାଦାମରୁ ମିଳିଥାଏ । ଭାରତରେ ୨୩.୪ ଲକ୍ଷ ହେକ୍ଟର କମ୍ପରେ ସୋରିଷ ଲୁଣ କରାଯାଇ ୭୮.୨ ଲକ୍ଷ ଟନ୍ ଉତ୍ପାଦନ ମିଳିଥାଏ । ଏହି ଫସଲର ଉତ୍ପାଦକତା ହେକ୍ଟର ପ୍ରତି ୧୨୩୪ କି.ଗ୍ରା. ଅଟେ । ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରାୟ ୧.୪୫ ଲକ୍ଷ ହେକ୍ଟର କମ୍ପରେ ସୋରିଷ ଲୁଣ କରାଯାଇ ହେକ୍ଟର ପ୍ରତି ୪୨୪ କି.ଗ୍ରା. ଅମଳ ସହିତ ୦.୬ ଲକ୍ଷ ଟନ୍ ଉତ୍ପାଦନ ମିଳିଥାଏ । ରାଜ୍ୟରେ ଧାନ ଭିତ୍ତିକ ଫସଲ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସୋରିଷ ପ୍ରମୁଖ କୃମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛି ।



କମ୍ପ ପ୍ରସ୍ତୁତି:

ସୋରିଷର ମଞ୍ଜି ଅତି କ୍ଷୁଦ୍ର ହୋଇଥିବାରୁ ପାରମ୍ପରିକ ଭାବେ ଏହା ବୁଣିବା ପୂର୍ବରୁ ମାଟିକୁ ଭଲ ଭାବେ ଗୁଣ୍ଡ କରାଯାଇଥାଏ । ମାଟିକୁ ଗୁଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ କମ୍ପକୁ ୨-୩ ଥର ହଳ କରିବା ପରେ ମଇଦେଇ ସମତୁଲ କରାଯାଇଥାଏ । କମ୍ପରୁ ଅନାବନା ଘାସ ଓ ଫସଲର ଅବଶିଷ୍ଟାଗ ବାହାର କରିଦିଆଯାଇଥାଏ । ତେବେ ଧାନ ବା ମକା ପରେ ସୋରିଷ ବୁଣିବାକୁ ଥିଲେ ହଳ ନକରି ବୁଣିଦେବା ଭଲ । ଏହା ହେଲେ ମାଟିର ବଳରକୁ ଉପଯୋଗ କରିବା ସହିତ ଶାସ୍ତ୍ର ବୁଣା କାମ ଶେଷ ହୋଇଥାଏ । ଏଥିପାଇଁ ଧାନ ପାଟିବା ପରେ ଅଧିକ ଦିନ କମ୍ପରେ ନ ରଖି କାଟିଦେବା ଭଲ । କାଟିବା ପରେ ଧାନକୁ ଶାସ୍ତ୍ର କିଆରୀରୁ ବାହାର କରିଦେବା ଉଚିତ୍ । କଟା ଯାଇଥିବା ଧାନକୁ କିଆରୀର ଗୋଟିଏ କଡ଼ରେ ଗଡ଼ା କରାଯାଇପାରେ ବା ଖଳାରେ ଗୁଣାଇ ଦିଆଯାଏ ।

ବୁଣିବା:

ବିହନ ବୁଣା ଯନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରି ଧାଡ଼ିବୁଣା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଉପଯୁକ୍ତ ଭୂରତା ଏବଂ ଠିକ୍ ଗଭୀରତାରେ ବିହନ ପତିବା ଯୋଗୁଁ ଭଲ ଗଜା ହୋଇଥାଏ । ଏହାଦ୍ୱାରା କମ୍ ବିହନ ଆବଶ୍ୟକ ହେବା ସହିତ ଉପଯୁକ୍ତ ଗଜା ଫାଖ୍ୟା ରହିଥାଏ । ସାର ବ୍ୟବହାର ଏବଂ କୋଡ଼ାଖୁଆ କାର୍ଯ୍ୟ ସହଜ ହୋଇଥାଏ ।



ସମଯୋଗକ ଅଳ୍ପରାଶି ଓ ସୁସ୍ଥ ଧାଡ଼ିବୁଣା ରାଇ ସୋରିଷ

ପାରମ୍ପରିକ ହଳ କରାଯାଇଥିଲେ ମିଟରି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥାଇ ବିହନ ଏବଂ ସାର ବାଲୁକା ଫସ୍ତୁଳ ଥିବା ଉନ୍ନତ ମାନର ସାର ଓ ବିହନ ବୁଣାଯନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ୍ । ପାରମ୍ପରିକ ହଳ ଓ ବିନା ହଳ କରିବା ପଦ୍ଧତିରେ କଣାଥିବା ରୋଲ୍ଲର ଓ ବିହନ ମିଟରି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିବା ବିନା ହଳ ବିହନ ତଥା ସାର ପ୍ରୟୋଗ ଯନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରେ । ଏହି ଯନ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ବୁଣିବା ପାଇଁ ବିହନକୁ ଫସଲର ସୁକ୍ଷ୍ମ ସାର (ଡିଏପି/ ଏନପିକେ) ସହିତ ମିଶାଇ ବିହନ ବାଲୁକାରେ ରଖାଯାଇଥାଏ ।

ମାଟିରେ ଯଥେଷ୍ଟ ବର୍ତ୍ତ ଥିବାବେଳେ ବିହନ ବୁଣିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଗୁଣ୍ଡା ବୁଣିବା ପରେ କଳସେତନ କଲେ ଗଜା ଫାଖ୍ୟା କମିବା ସହିତ ଅଧିକ ଘାସ ହୋଇଥାଏ ।

ବୁଣିବା ସମୟ

- ସୋରିଷ/ରାଇ ସୋରିଷ: ଅକ୍ଟୋବର ମଧ୍ୟ ଭାଗରୁ ନଭେମ୍ବର ମଧ୍ୟ ଭାଗ ।

ବିହନ ପରିମାଣ:

- ରାଇ ସୋରିଷ: ଏକର ପ୍ରତି ୨.୫-୩ କି.ଗ୍ରା.
- ସଜ୍ଜା କିମ୍ପ୍ରମ ରାଇ ସୋରିଷ: ଏକର ପ୍ରତି ୧-୧.୫ କି.ଗ୍ରା.
- ସୋରିଷ: ଏକର ପ୍ରତି ୧.୫-୨ କି.ଗ୍ରା.

ବିହନ ବିଶୋଧନ:

- ପ୍ରତି କିଲୋଗ୍ରାମ ବିହନ ସହିତ ୨.୫ ଗ୍ରାମ୍ ଥିରାମ କିମ୍ବା ୨ ଗ୍ରାମ୍ ବାରିକ୍ସିନ୍ ମିଶାଇ ବିଶୋଧନ କରନ୍ତୁ ।

- ବୁଣିବା ଦୂରତା: ରାଇ ସୋରିଷ ଓ ସଜ୍ଜା କିମ୍ପ୍ରମ ବିହନ:

- ଧାଡ଼ିକୁ ଧାଡ଼ି- ୩୦ ସେ.ମି. ସୋରିଷ: ଧାଡ଼ିକୁ ଧାଡ଼ି- ୨୦-୨୫ ସେ.ମି

- ବୁଣିବାର= ଗଭୀରତା: ୨-୨.୫ ସେ.ମି

କିମ୍ପ୍ରମ

- ରାଇସୋରିଷ: କେଡ଼ି ୨, ପୁଷାବୋଲଡ, ପୁଷା କୟ୍‌କିଷାନ୍, ବି ୯
- ସଜ୍ଜା କିମ୍ପ୍ରମ: ବେୟର ୫୧୧୧, ମାହିକୋ ବୋଲଡ
- ସୋରିଷ: ଏମ ୨୭, ଅନୁରାଧା, ପାର୍ବତୀ



ଡିଏପି କିମ୍ବା ଏନପିକେ ସାର ସହ ବିହନର ମିଶ୍ରଣ



ବିନା ଚାଷରେ ବିହନ ବୁଣା ଯନ୍ତ୍ର ଦ୍ଵାରା ସୋରିଷ ବୁଣା

ଖାଦ୍ୟସାର ପରିଚ୍ଛେଦନା:

ସୋରିଷ ଫସଲ ପାଇଁ ଯବସାର ଓ ଫସଫରସ ପ୍ରମୁଖ ଖାଦ୍ୟସାର ଅଟେ ।

- ରାଇ ସୋରିଷ: ହେକ୍ଟର ପ୍ରତି ୮୦ କି.ଗ୍ରା. ଯବସାର, ୪୦ କି.ଗ୍ରା. ଫସଫରସ ଓ ୪୦ କି.ଗ୍ରା. ପଟାସ
- ସଜ୍ଜର କିମ୍ପ: ହେକ୍ଟର ପ୍ରତି ୧୦୦ କି.ଗ୍ରା. ଯବସାର, ୫୦ କି.ଗ୍ରା. ଫସଫରସ ଓ ୫୦ କି.ଗ୍ରା. ପଟାସ
- ସୋରିଷ: ହେକ୍ଟର ପ୍ରତି ୬୦ କି.ଗ୍ରା. ଯବସାର, ୩୦ କି.ଗ୍ରା. ଫସଫରସ ଓ ୩୦ କି.ଗ୍ରା. ପଟାସ
- ରାଇସୋରିଷ: ବୁଣିବାବେଳେ ବିହନ ବୁଣା ଯନ୍ତ୍ର ସହିତ ଏକର ପ୍ରତି ୩୦-୩୫ କି.ଗ୍ରା. ଡିଏପି ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ । ପ୍ରଥମ କଳସେଚନ ପୂର୍ବରୁ ଏକର ପ୍ରତି ୫୦-୫୫ କି.ଗ୍ରା. ଯୁରିଆ ଓ ୨୫ କି.ଗ୍ରା. ମ୍ୟୁରେର ଅଫ ପଟାସ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ।
- ସଜ୍ଜର କିମ୍ପ: ବୁଣିବାବେଳେ ବିହନ ବୁଣା ଯନ୍ତ୍ର ସହିତ ଏକର ପ୍ରତି ୩୫-୪୦ କି.ଗ୍ରା. ଡିଏପି ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ । ପ୍ରଥମ କଳସେଚନ ପୂର୍ବରୁ ଏକର ପ୍ରତି ୬୦ କି.ଗ୍ରା. ଯୁରିଆ ଓ ୩୫ କି.ଗ୍ରା. ମ୍ୟୁରେର ଅଫ ପଟାସ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ।
- ସୋରିଷ: ବୁଣିବାବେଳେ ବିହନ ବୁଣା ଯନ୍ତ୍ର ସହିତ ଏକର ପ୍ରତି ୨୦-୨୫ କି.ଗ୍ରା. ଡିଏପି ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ । ପ୍ରଥମ କଳସେଚନ ପୂର୍ବରୁ ଏକର ପ୍ରତି ୩୫-୪୦ କି.ଗ୍ରା. ଯୁରିଆ ଓ ୨୦ କି.ଗ୍ରା. ମ୍ୟୁରେର ଅଫ ପଟାସ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ । ମଞ୍ଜିରେ ଚୈଳ ଅଂଶ ଓ ପୁଷ୍ପସାର ପରିମାଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଗନ୍ଧକ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ । ଏହାଦ୍ଵାରା ଅମଳ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ । ବୁଣିବା ବେଳେ ଏକର ପ୍ରତି ୧୦ କି.ଗ୍ରା. ଗନ୍ଧକ ସାର (ଗ୍ରେମୋର) ବିସ୍ତ୍ରବେଦ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ।

କଳସେଚନ

ମାଟିର ବତର ଓ ଗଛର ସଜ୍ଜାବଳୀର ଅବସ୍ଥା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି କଳସେଚନ କରିବାକୁ ହୋଇଥାଏ ।

ରାଇସୋରିଷ: ନିମ୍ନ ଅବସ୍ଥାମାନଙ୍କରେ ତିନିଥର କଳସେଚନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ।

- ତାଳ ହେବା ଅବସ୍ଥା:- ବୁଣିବାର ୨୫-୩୦ ଦିନ ପରେ
- ଫୁଲ ହେବା ଅବସ୍ଥା:- ବୁଣିବାର ୪୦-୫୦ ଦିନ ପରେ
- ଦାନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ଅବସ୍ଥା:- ବୁଣିବାର ୬୦-୭୫ ଦିନ ପରେ

ସୋରିଷ: ଦୁଇଟି କଳସେଚନ ଦରକାର ।

- ତାଳ ହେବା ଅବସ୍ଥା: ବୁଣିବାର ୨୫-୩୦ ଦିନ ପରେ
- ଦାନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥା: ବୁଣିବାର ୪୦-୫୦ ଦିନ ପରେ
- ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ବର୍ଷା ହେଲେ କଳସେଚନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇନଥାଏ ।

ଅନାବନା ଘାସ ବମନ ଓ କୋଡ଼ାଶୁସା:

ଭଲ ଅମଳ ପାଇବା ପାଇଁ କମିତୁ ଘାସମୂଳ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଏଥିପାଇଁ ବୁଣିବା ପରଦିନ ହେକ୍ଟର ପ୍ରତି ୧ କି.ଗ୍ରା. ପେଣ୍ଟିମେଥାଲିନ୍ କ୍ରିୟାଶୀଳ ପଦାର୍ଥ (ଏକର ପ୍ରତି ୧.୨୫ ଲିଟର ବ୍ୟବସାୟିକ ଉତ୍ପାଦ)କୁ ୨୦୦ ଲିଟର ପାଣି ସହିତ ମିଶାଇ କମିରେ ଟେକି କରାଯାଇପାରେ ।

ଏହା ବଦଳରେ ବୁଣିବାର ୨୦-୨୫ ଦିନ ପରେ ହେକ୍ଟର ପ୍ରତି ୩୭.୫ ଗ୍ରାମ୍ ଡିଜାଲିଫୋସ୍ଫୋରସ୍ କ୍ରିୟାଶୀଳ ପଦାର୍ଥ (ଏକର ପ୍ରତି ୪୦୦ ମି.ଲି. ଉତ୍ପାଦ)କୁ ୨୦୦ ଲିଟର ପାଣି ସହିତ ମିଶାଇ କମିରେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇପାରିବ ।

ବିନା ହଳରେ ବିହନ ବୁଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଏକର ପ୍ରତି ୧୦୦୦ ମି.ଲି. ଗ୍ଲାଇଫୋସେଟ୍ (ପ୍ରତି ୧୫ ଲିଟର ଟେକ୍ସ୍ଟରରେ ୯୦ ମି.ଲି. ଦ୍ରାବ୍ୟରେ ୧୨ ଥର) ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ପୁରୁଣା ଘାସ ମରିଯାଇଥାଏ ।

ବହୁଳିଆ ଗଛ ରପାତିବା:

ଏହା ଏକ ଗୁରୁତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ । ହେକ୍ଟର ପ୍ରତି ୪-୫ କି.ଗ୍ରା. ବିହନ ବୁଣାଗଲେ ବର୍ଗମିଟର ପିଛା ୮୦-୯୦ ଗଛ ରୁପିଥାଏ । ଅଧିକ ଅମଳ ପାଇବା ପାଇଁ ବର୍ଗମିଟର ପିଛା ରାଇସୋରିଷର ୨୫-୩୦ ଗଛ ଓ ସୋରିଷର ୪୦-୫୦ ଗଛ ରହିବା ଉଚିତ୍ । ଏଥିପାଇଁ ବୁଣିବାର ୨୦-୨୫ ଦିନ ପରେ ସାର ପ୍ରୟୋଗ ପୂର୍ବରୁ ବଳକା ଗଛକୁ ରପାତି ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ । ବଳକା ଗଛ ରପାତିବା ସହିତ ଅନାବନା ଗଛ ମଧ୍ୟ ସଫା କରାଯାଇପାରେ ।

ରୋଗପୋକ ପରିଚ୍ଛେଦନା:

କୃଷି ବିଶ୍ଵବିଦ୍ୟାଳୟର ସୁପାରିଶ ଅନୁସାରେ ନିମ୍ନମତେ ରୋଗପୋକ ପରିଚ୍ଛେଦନା କରାଯାଇପାରେ ।

କରପୋକ ବମନ ପାଇଁ ଏକର ପ୍ରତି ୪୦୦ ମି.ଲି. ମିଥାଇଲ୍ ଡିମେଟେନ୍ ବା ଡାଇମିଥାଏର୍ କିମ୍ବା ୫୦ ମି.ଲି. ଇମିଡାକ୍ଲୋପ୍ରିଡ୍ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇପାରେ । କରତିଆ ମାଛି ବମନ ପାଇଁ ଏକର ପ୍ରତି ୪୦୦ ମି.ଲି. ଟ୍ରାୟାକୋଫସ୍ ବା କୁଇନାଲ୍ଫସ୍ ଅବଳବଦଳ କରି ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇପାରେ । ପତ୍ରପୋତା ପୋକ ବମନ ନିମନ୍ତେ ଏକର ପ୍ରତି ୪୦୦ ମି.ଲି. କୁଇନାଲ୍ଫସ୍ ପ୍ରୟୋଗ କରିବାକୁ ହେବ । ପତ୍ର ଦାଗ ରୋଗ ହେଲେ ପ୍ରତି ୧୪ ଦିନ ବ୍ୟବଧାନରେ ଶତକଡା ୦.୨ ଭାଗ କୁମାରୀଲ୍ ବା କ୍ଲୋଟେକ୍ସ-୫୦ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଏକର ପ୍ରତି ୧୫୦-୨୦୦ ଲିଟର ପାଣି ଟେକି କରିବା ଦରକାର ।



ବିନା ଚାଷରେ ସମପୋଷକ ଅଂକୁରଣ ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ସୋରିଷ

ଅମଳ:

ଗଛଗୁଡ଼ିକ ହଳତିଆ ବା ବାଦାମୀ ରଙ୍ଗର ପତ୍ରଗଲେ ଅମଳ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ । ଅଧିକାଂଶ ପତ୍ର ଝଟି ପଡେ ବା ହଳତିଆ ରଙ୍ଗର ହୋଇଥାଏ । ମୂଳରେ ଥିବା କେତେକ ଛୁଇଁକୁ ଛାଡିଦେଲେ ଅନ୍ୟ ଛୁଇଁ ଗୁଡ଼ିକ ଉଷ୍ଣ ହଳତିଆ ଦେଖାଯିବା ସହିତ ଏଥିରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଜଳାୟୁ ଅଂଶ ରହିଥାଏ । ସକାଳୁ ଫସଲ ଅମଳ କରିବା ଉଚିତ୍ । ଏହା ହେଲେ ଛୁଇଁ ଫାଟିଯାଇ ମଞ୍ଜି ନଷ୍ଟ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହେ ନାହିଁ ।

ଅମଳ ପରେ ଗଛକୁ ନେଇ ଖଳାରେ ୨-୩ ଦିନ ଶୁଖାଇ ଦେବାକୁ ହେବ । ଏହାପରେ ମଞ୍ଜିକୁ ଅମଳ କରାଯାଇଥାଏ । ମଞ୍ଜିକୁ ଭଲଭାବେ ସଫା କରି ଖରାରେ ଶୁଖାଯାଏ । ଏହାର ଜଳାୟୁ ଅଂଶ ଶତକଡା ୭ ଭାଗକୁ କମି ଆସିଲେ ସାଇତି ରଖିବାକୁ ହୁଏ ।

ଏକର ପ୍ରତି ଆହୁମାନିକ ଲାଭକ୍ଷତି ହିସାବ

କାର୍ଯ୍ୟ	ବ୍ୟୟ (ଟଙ୍କାରେ)	
	ରାଇ ସୋରିଷ	ସୋରିଷ
କମି ପ୍ରସ୍ତୁତି (ପାରମ୍ପରିକ ହଳ)	୧୦୦୦	୧୦୦୦
କମି ପ୍ରସ୍ତୁତି (ବିନା ହଳ)	-	-
ବିହନ ବୁଣା ଯନ୍ତ୍ରରେ ଧାଡ଼ିବୁଣା	୬୦୦	୬୦୦
ବିହନ ମୂଲ୍ୟ	୩୦୦ (କି.ଗ୍ରା. ୧୦୦ ଟଙ୍କା)	୧୦୦ (କି.ଗ୍ରା. ପ୍ରତି ୫୦ ଟଙ୍କା)
ଘାସମୂଳ ଔଷଧ (ପାରମ୍ପରିକ)	୫୦୦	୫୦୦
ଘାସମୂଳ ଔଷଧ (ବିନାହଳ)	୮୦୦	୮୦୦
କାଟନାଶକ ଔଷଧ	୫୦୦	୫୦୦
ବହୁଳିଆ ଗଛ ରପାତିବା	୧,୦୦୦	୧,୦୦୦
ରାସାୟନିକ ସାର	୧୨୦୦	୧୧୦୦
କଳସେଚନ*	୧୫୦୦	୧୦୦୦
ଅମଳ	୬୦୦	୬୦୦
ମଞ୍ଜି ଅଲଗା କରିବା	୬୦୦	୬୦୦
ମୋଟ ଖର୍ଚ୍ଚ (ପାରମ୍ପରିକ ହଳ)	୮୨୦୦	୭୦୦୦
ମୋଟ ଖର୍ଚ୍ଚ (ବିନା ହଳ)	୭,୫୦୦	୬,୩୦୦
ସୂଚନା: ଶୀତ ଋତୁରେ କଳସେଚନ ସୁବିଧା ଥିବା ସ୍ଥାନରେ ସୋରିଷ ଓ ରାଇ ସୋରିଷକୁ ଧାନ ଭିତ୍ତିକ ଫସଲ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏକ ଉତ୍ତମ ଫସଲ ଭାବେ ନିଆଯାଇପାରେ । ଧାନ ଋଷ ପରେ ପଡ଼ିଥା ପଡ଼ୁଥିବା କମିରେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ସଫଳ ଭାବେ ଋଷ କରାଯାଇପାରିବ ।		