



USAID
FROM THE AMERICAN PEOPLE

**BILL & MELINDA
GATES foundation**



CIMMYT
International Maize and Wheat Improvement Center



IRRI

ଅଧିକ ଅମଳ ପାଇଁ ହାଇବ୍ରିଡ ମକା ଚାଷ

ଉପଯୁକ୍ତ ଗଛ ସଂଖ୍ୟା

ଧାଡ଼ିକୁ ଧାଡ଼ି ୬୦ ସେମି ଓ ଗଛକୁ ଗଛର ବ୍ୟବଧାନ ୨୦ ସେମି ରଖନ୍ତୁ ।
ଏକର ପିଛା ୩୦,୦୦୦ ରୁ ୩୨,୦୦୦ ଗଛ ରଖନ୍ତୁ ।
ଉପଯୁକ୍ତ ଗଛ ସଂଖ୍ୟା ରଖିବା ପାଇଁ ମକା ମଞ୍ଜିକୁ ସାତ ଡ୍ରିଲ ବ୍ୟବହାର କରି
ବା ଲଙ୍ଗଲ ସିଆର ପଛରେ ଧାଡ଼ିରେ ବୁଣନ୍ତୁ ।
ମଞ୍ଜିକୁ ଅଳ୍ପ ଗଭୀରରେ ୪-୫ ସେମି ଭିତରେ ବୁଣନ୍ତୁ ।

ଖାଦ୍ୟସାର ପରିଚାଳନା

ଜମି ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମୟରେ ଏକର ପ୍ରତି ୫ ରୁ ୬ ଶଗଡ଼ ଗାଡ଼ି (୨୫ ରୁ ୩୦
କୁଇଣ୍ଟାଲ) ଶଙ୍ଖା ଗୋବର ଖତ ଜମିରେ ପକାନ୍ତୁ ।
ଏକର ପ୍ରତି ୬୦ କି.ଗ୍ରା ଯବକ୍ଷାରଯାନ, ୨୫ କି.ଗ୍ରା ଫସଫରସ ଓ ୨୫
କି.ଗ୍ରା ପୋଟାସ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ।
ମୂଳସାର : ଡି.ଏ.ପି.- ୫୫ କି.ଗ୍ରା, ଏମ.ଓ.ପି.- ୨୨ କି.ଗ୍ରା
ଛୁଡ଼ା ଟେକା ବେଳେ (ବୁଣିବାର ୨୦-୨୫ ଦିନ ପରେ, ଗଛ ଆଣ୍ଟୁ
ଉଜଡ଼ାର ହେଲାପରେ): ଇଉରିଆ - ୫୫ କି.ଗ୍ରା
ଗଛରେ ଅଣ୍ଟିରା ଫୁଲ ବା ଧାନିଆ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ (ବୁଣିବାର ୪୫-
୫୦ ଦିନ ପରେ,): ଇଉରିଆ - ୫୫ କି.ଗ୍ରା ଓ ଏମ.ଓ.ପି.- ୨୨ କି.ଗ୍ରା

ଘାସ ପରିଚାଳନା

ବୁଣିବାର ୧ ରୁ ୨ ଦିନ ଭିତରେ ବା ୧୫ ଦିନ ପରେ ଏକର ପ୍ରତି ୪୦୦
ଗ୍ରାମ ଆଗ୍ରାଜିନ ଜାତୀୟ ଔଷଧ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ (ଲିଟର ପ୍ରତି ୨ ଗ୍ରାମ
ହିସାବରେ) ।
ଜମିରେ ବତର ଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଏହି ଘାସମରା ଔଷଧ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ । ଶୁଖିଲା ଜମିରେ
ବିହନ ବୁଣୁଥିଲେ ବର୍ଷା ହେବା ପରଦିନ ଘାସମରା ଔଷଧ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରେ ।
ଔଷଧ ସ୍ତେ କରିବା ପାଇଁ ଫ୍ଲଟ ଫ୍ୟାନ ନୋଜଲ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ।
ବୁଣିବାର ୨୫ ରୁ ୩୦ ଦିନ ପରେ ଘାସ ବାଛିବା ସହିତ ଜମିକୁ କୋଡାଖୋସା
କରାଯିବା ଉଚିତ ।



ସାତ ଡ୍ରିଲ ଦ୍ଵାରା ମକା ବୁଣା



ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ:
www.csisa.org
Email: cimmyt-csisa@cgiar.org

ଏହା CIMMYT, IRRI ଏବଂ IFRIର ମିଳିତ ପ୍ରକଳ୍ପ CSISA ଦ୍ଵାରା ପ୍ରକାଶିତ ।
CSISA ପ୍ରକଳ୍ପଟି USAID ଏବଂ BMGFର ଆର୍ଥିକ ଅନୁଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ ଅଟେ ।