



USAID
FROM THE AMERICAN PEOPLE

**BILL & MELINDA
GATES foundation**



Cereal Systems Initiative for South Asia

CIMMYT
International Maize and Wheat Improvement Center



IRRI



ବ୍ୟବସାୟିକ ଭିତ୍ତିରେ ଧାନତଳି ଉତ୍ପାଦନ

ବୃଷ୍ଟିପାତରେ ଅନିୟମିତତା ଯୋଗୁଁ ବେଳେବେଳେ ଧାନ ରୋଇବାରେ ବିଳମ୍ବ ଘଟିଥାଏ । ସେହିପରି ଅତ୍ୟଧିକ ବୃଷ୍ଟିପାତ ଯୋଗୁଁ ପାଣି ଜମି ରହିବା ଫଳରେ ମଧ୍ୟ ସବ୍ୟ ରୁଆଯାଇଥିବା ଧାନ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ । ତେଣୁ ଉନ୍ନତ ମାନର ଧାନ ତଳି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇପାରିଲେ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଏହାର ଚାହିଦା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ।

ରୋଇବା ପଛତି, ଜଳସେଚନର ସୁବିଧା, ଶ୍ରମିକ ମିଳିବା ଓ କୃଷି ଯନ୍ତ୍ରପାତି ବ୍ୟବହାର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ନିମ୍ନଲିଖିତ ୧୦ଟି ପରିଚାଳନା ତତ୍ତ୍ୱ ଅନୁସାରେ ଧାନ ତଳି ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଇପାରିବ ।

୧. ତଳି ଉତ୍ପାଦନ ନିମନ୍ତେ ସଂପୃକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳର ଜଳବାୟୁ ସହ ଖାପ ଖୁଆଇବା ତଥା ବହୁଳ ଭାବେ ଆଦୃତ ଅଧିକ ଅମଳକ୍ଷମ ବା ଶଙ୍କର କିସମ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ।

୨. ଏଥିପାଇଁ ଜଳସେଚନର ସୁବିଧାଥିବା, ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିବା ଓ ଉପଯୁକ୍ତ ଖରା ପଡୁଥିବା ସ୍ଥାନ ଚୟନ କରନ୍ତୁ ।

୩. **ଏକ ଏକର ଜମିରେ ରୋଇବା ନିମନ୍ତେ ଆର୍ଦ୍ର ତଳିଘେରା ପ୍ରସ୍ତୁତି:** ଏକ ଏକର ଜମିରେ ରୋଇବା ପାଇଁ ସୁସ୍ଥ ସବଳ ଚାରା ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ୩୦୦ ରୁ ୪୦୦ ବର୍ଗ ମିଟର ସ୍ଥାନରେ ତଳି ପକାଇବା ଉଚିତ । ଏହାକୁ ନିମ୍ନ ଭାବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇପାରିବ ।

- ରବି ଫସଲ ଅମଳ ପରେ ଜମିକୁ ଦୁଇଥର ଟ୍ରାକ୍ଟରରେ ହଳ କରନ୍ତୁ ।
- ବିହନ ବୁଣିବାର ୨୫-୩୦ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରତି ୩୦୦-୪୦୦ ବର୍ଗମିଟର ସ୍ଥାନରେ ୨ କୃଷ୍ଣାଳ ସଜା ଗୋବର ଖତ ବା କମ୍ପୋଷ୍ଟ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଭଲଭାବେ ମାଟିରେ ମିଶାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ।
- ତଳିଘେରାରେ ଜଳସେଚନ କରି ପତଳର ବା ରୋଟାଭେଟର ସାହାଯ୍ୟରେ ୧-୨ ଥର କାନ୍ଦୁଅ କରନ୍ତୁ ।

- ଏହାପରେ ୧-୨ ମିଟର ଓସାର, ସୁବିଧା ଅନୁସାରେ ଲମ୍ବ (ସର୍ବାଧିକ ୧୦ ମିଟର) ଓ ୧୦-୧୫ ସେଣ୍ଟିମିଟର ଉଚ୍ଚତାର ତଳିପଟାଳି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ । ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ପାଇଁ ପ୍ରତି ପଟାଳି ମଝିରେ ୩୦ ସେଣ୍ଟିମିଟର ଓସାରର ସ୍ଥାନ ଛାଡନ୍ତୁ ।

୪. **ବିହନର ମାନ:** ଏକ ଭରସାଯୋଗ୍ୟ ଉତ୍ସ ଯଥା ଅଧିକୃତ ବିକ୍ରେତାଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରମାଣିକୃତ ଅଧିକ ଅମଳକ୍ଷମ ବା ଶଙ୍କର କିସମ ବିହନ କ୍ରୟ କରନ୍ତୁ ।

୫. **ବିହନ ଭିଜାଇବା ଓ ବିଶୋଧନ:** ବୁଣିବା ପୂର୍ବରୁ ବିହନକୁ ପାଣିଥିବା ବାଲଟିରେ ରଖି ଘାଷନ୍ତୁ । ପାଣିରେ ଭାସୁଥିବା ବିହନକୁ ବାହାର କରିଦିଅନ୍ତୁ । ନିଜ ବିହନ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ଏଥିପାଇଁ ଲୁଣ ପାଣି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ । ଥରକରେ ୧୦ ଲିଟର ପାଣି ସହ ୧ କିଲୋଗ୍ରାମ ଲୁଣ ମିଶାଇ ଏଥିରେ ୧.୫-୨ କିଲୋଗ୍ରାମ ବିହନ ଭର୍ତ୍ତି କରନ୍ତୁ । ପାଣିରେ ଭାସୁଥିବା ବିହନକୁ ବାହାର କରିଦିଅନ୍ତୁ । ବୁଡିଯାଇଥିବା ବିହନକୁ ୨-୩ ଥର ସଫା ପାଣିରେ ଧୋଇ ବୁଣିବା ପାଇଁ ରଖନ୍ତୁ ।

- **ଗଜାଧାନ ବୁଣିବା:** ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରତି ଲିଟର ପାଣି ସହିତ ୨ ଗ୍ରାମ ବାଭିଷ୍ଟିନ୍ ବା ୧ ଗ୍ରାମ ରାକ୍ସିଲ ମିଶାଇ ଏଥିରେ ୧ କିଲୋଗ୍ରାମ ବିହନକୁ ଗୋଟିଏ ରାତି ଭିଜନ୍ତୁ । ଏହାପରେ ପାଣି ନିଗାତିଦେଇ ଓଦାଧାନକୁ ଗୋଟିଏ ଅଖାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରନ୍ତୁ । ଏହାକୁ ୨୪-୩୬ ଘଣ୍ଟା



ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପବନ ଚଳାଚଳ କରୁଥିବା ଛାଇ ସ୍ଥାନରେ ରଖିଲେ ଏଥିରୁ ଗଜା ବାହାରିଥାଏ । ପରସ୍ପର ସହିତ ଛଦି ନ ହେବା ପାଇଁ ଗଜାର ଲମ୍ବ ୭-୮ ମିଲିମିଟରରୁ ଅଧିକ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ।

୬. **ବିହନ ପରିମାଣ ଓ ବୁଣିବା:** ଅଧିକ ଅମଳକ୍ଷମ କିଷକ ପାଇଁ ବର୍ଗମିଟର ପ୍ରତି ୨୫-୪୦ ଗ୍ରାମ (୩୦୦-୪୦୦ ବର୍ଗମିଟର ପ୍ରତି ୧୦-୧୨ କି.ଗ୍ରା) ଏବଂ ଶଙ୍କର କିଷକ ପାଇଁ ବର୍ଗମିଟର ପ୍ରତି ୧୫ ଗ୍ରାମ (୩୦୦-୪୦୦ ବର୍ଗମିଟର ପ୍ରତି ୫-୬ କି.ଗ୍ରା) ବିହନ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଟେ । ଅଧିକ ଦଳର ତଳି ଲଗାଇବାକୁ ଥିଲେ ବର୍ଗ ମିଟର ପ୍ରତି ୨୫-୩୦ ଗ୍ରାମ (୩୦୦-୪୦୦ ବର୍ଗମିଟର ପ୍ରତି ୧୦-୧୨ କି.ଗ୍ରା) ବିହନ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ ।

- ଗଜା ହୋଇଥିବା ଧାନ ବିହନକୁ ତଳିପଟାଳିରେ ଛାଟି କରି ପକାନ୍ତୁ ଯେପରି ଏହା କାନ୍ଥୁଆରେ ଲାଗିଯିବ । ଏହାଦ୍ୱାରା ପାଣି ସହିତ ବିହନ ଭାସି ଯିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିବ ନାହିଁ । ଏହାର ଚେର ଶାନ୍ତ ମାଟିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ ।
- ପକ୍ଷୀ, ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷା ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀମାନେ ଯେପରି ବିହନ ନଷ୍ଟ ନ କରନ୍ତି ସେଥିପ୍ରତି ନଜର ଦିଅନ୍ତୁ ।

୭. **ବୁଣିବା ସମୟ ଓ ତଳିର ବୟସ:**

- **ବିଳୟ କିଷକ:** ମେ ମାସ ୧-୨୫ ତାରିଖ ଏବଂ ୩୦-୩୫ ଦିନର ତଳି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ।
- **ମଧ୍ୟମ କିଷକ:** ମେ ମାସ ୧୫ ତାରିଖରୁ ଜୁନ ମାସ ୧୫ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ୨୫-୩୦ ଦିନର ତଳି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ।
- **ସଅଳ କିଷକ:** ଜୁନ୍ ମାସ ୧୦ ରୁ ୨୫ ତାରିଖ ଏବଂ ୨୦-୨୫ ଦିନର ତଳି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ।

- ଉପଯୁକ୍ତ ଜଳ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହିତ ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ଥିଲେ ୧୫-୨୫ ଦିନର ତଳି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ ।
- ପ୍ରାଥମିକ ଅବସ୍ଥାରେ ପାଣି ଜମି ରହୁଥିଲେ ବା ଲୁଣାଜମି ହୋଇଥିଲେ ଅଧିକ ତେଜା ଓ ଟାଣ ତଳି (୩୦-୪୦ ଦିନର) ବ୍ୟବହାର କଲେ ସୁଫଳ ମିଳିଥାଏ ।
- ମରୁଡି ସହନଶୀଳ ସଅଳ କିଷକ ପାଇଁ ୨୫ ଦିନିଆ ତଳି ବ୍ୟବହାର କରିବା ଭଲ ।

୮. **ଖାଦ୍ୟସାର ପରିଚାଳନା:** ପୂର୍ବୋକ୍ତ ତଳି ପଟାଳିରେ (୩୦୦-୪୦୦ ବର୍ଗମିଟର) ମୂଳ ସାର ହିସାବରେ ୪ କି.ଗ୍ରା. ଡିଏପି, ୨.୪ କି.ଗ୍ରା. ଏମପି ଏବଂ ୧.୦ କି.ଗ୍ରା. ଜିଙ୍କ ସଲଫେଟ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ । ଏହାର ୧୩-୨୫ ଦିନ ପରେ ୨.୮ କି.ଗ୍ରା. ଯୁରିଆ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ । ୩୦ ଦିନରୁ ଅଧିକ ବୟସର ତଳି ରୋଇବାର ଥିଲେ ତଳି ଉପାଡିବାର ୧ ସପ୍ତାହ ପୂର୍ବରୁ ୨.୨ କି.ଗ୍ରା ଯୁରିଆ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ । ଲୌହ ଅଭାବ ଜନିତ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଗଲେ ତଳିଘେରାରେ ଶତକଡ଼ା ୦.୫ ଭାଗ ଫେରସ ସଲଫେଟ ସ୍ତେ କରନ୍ତୁ ।

୯. **ଘାସ ଦମନ:** ବୁଣିବାର ୧-୩ ଦିନ ପରେ ତଳିଘେରାର ୬୦ ଗ୍ରାମ ସୋର୍ପିଟକୁ (ପେଟିଲାକ୍ଲୋର ୩୦ ଇସି+ସେଫନର) ୫-୬ କି.ଗ୍ରା. ବାଲି ସହିତ ମିଶାଇ ତଳିଘେରାରେ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ।

୧୦. **ଜଳସେଚନ:** ତଳି ଘେରାରେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଅଳ୍ପ ଜଳସେଚନ କରନ୍ତୁ ଯେପରି ଜମି ଓଦା ରହିବ । କିନ୍ତୁ ଖରାବେଳେ ଠିଆପାଣି ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ । ଏହାହେଲେ କଅଁଳ ଚାରାଗଛ ଗୁଡିକ ଉତ୍ତାପ ପ୍ରଭାବରେ ଝାଉଁଳି ପଡିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି । ତଳି ଉପାଡିବା ପୂର୍ବରୁ ଜଳସେଚନ କଲେ ସହଜରେ ତଳି ଉଠାଯାଇପାରେ । ଚାରାଗଛକୁ ମୂଳରୁ ଧରି ଉପାଡନ୍ତୁ । ସହଜରେ ପରିବହନ ପାଇଁ ଏହାକୁ କଟା ବାନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ ।



ସୂଚନା: ବ୍ୟବସାୟିକ ଭିତ୍ତିରେ ତଳି ଉତ୍ପାଦନ ପୂର୍ବରୁ ଲାଭକ୍ଷତି ହିସାବ ନିମନ୍ତେ ବିକ୍ରି ହୋଇପାରୁନଥିବା ଚାରା ଗଛ ପାଇଁ ଶତକଡ଼ା ୨୫ ଭାଗ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହିସାବକୁ ନିଆଯାଇପାରେ ।